

細菌学検査

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数
塗抹検査(グラム染色)	分泌物/膿/その他	適量	冷蔵	2~4
一般細菌培養同定	分泌物/膿/その他	適量	冷蔵	5~8
尿定量培養同定 ※滅菌スピッツ使用	尿	10mL	冷蔵	5~8
嫌気性菌培養同定	分泌物/非開放性膿 /その他	適量	冷蔵	6~15
真菌培養 (酵母様真菌培養・糸状菌培養・ クリプトコッカス培養)	皮膚/被毛/その他	適量	冷蔵	14~40 ※同定され次第、随時報告
血液培養 ※血液培養専用ボトル使用	血液	2.0~ 4.0mL	常温	5~8
大腸菌血清型	糞便	適量	冷蔵	5~8
カンピロバクター培養	糞便	適量	冷蔵	5~8

薬剤感受性試験セット

系統名	基本セット	皮膚セット	尿セット
ペニシリン	ABPC(内服/注射) AMPC(内服) CVA/AMPC(内服)	ABPC(内服/注射) AMPC(内服) CVA/AMPC(内服)	ABPC(内服/注射) AMPC(内服) CVA/AMPC(内服)
セフェム	CEX(内服) CPDX(内服) CTX(注射)	CEX(内服) CTX(注射)	CEX(内服) CPDX(内服) CTX(注射)
マクロライド	EM(内服/注射) CAM(内服)	EM(内服/注射) AZM(内服)	EM(内服/注射)
リンコマイシン	CLDM(内服/注射/外用)	CLDM(内服/注射/外用)	CLDM(内服/注射/外用)
キノロン	ERFX(内服/注射) OFLX(内服/外用) LVFX(内服/外用)	ERFX(内服/注射) OFLX(内服/外用) OBFX(内服/注射/外用)	ERFX(内服/注射) OFLX(内服/外用) OBFX(内服/注射/外用)
テトラサイクリン	DOXY(内服) MINO(内服/注射)	DOXY(内服) TC(内服/注射)	DOXY(内服) MINO(内服/注射)
アミノグリコシド	GM(注射/外用)	GM(注射/外用)	GM(注射/外用) AMK(注射)
ペネム	FRPM(内服)	FRPM(内服)	FRPM(内服)
カルバペネム		IPM(注射)	
その他	CP(内服/注射/外用) ST(内服/注射) FOM(内服/注射)	CP(内服/注射/外用) ST(内服/注射) FOM(内服/注射)	CP(内服/注射/外用) ST(内服/注射) FOM(内服/注射)

※感受性セットの料金はすべて2,530円 検査日数は6~11日

細菌培養検体の採取・保存における一般的注意事項

- (検体の採取条件)
- ・発病初期の抗菌薬投与前に採取してください。
 - ・抗菌薬投与中や抗菌薬投与を中止出来ない場合には、次回投与の直前に採取してください。
- (採取時の注意事項)
- ・起炎菌の推定が困難となる為、常在菌や消毒薬の混入がないようご配慮ください。
 - ・検査に必要な適切な量を採取してください。
 - ・適切な容器に採取してください。
 - ・検体採取者の二次感染や環境の汚染防止に配慮してください。
- (運送・保存時の注意事項)
- ・検体採取後は速やかに動物ケンサに提出してください。
 - ・検体の乾燥を防いでください。
 - ・運送時の環境汚染や二次感染を防ぐため、ジップ付ポリ袋に検体を入れてください。
 - ・直ちに提出出来ない場合には適切な保存条件で保存してください。(原則4℃一部例外あり)

感受性試験薬剤リスト

ペニシリン		モノバクタム		テトラサイクリン	
PC	ペニシリン	AZT	アズトレオナム	TC	テトラサイクリン
MPIPC	オキサリシン	ベネム		DOXY	ドキシサイクリン
ABPC	アンピシリン	FRPM	ファロベネム	MINO	ミノサイクリン
AMPC	アモキシシリン	カルバベネム		アミノグリコシド	
PIPC	ピペラシリン	IPM	イミペネム	SM	ストレプトマイシン
CVA/AMPC	クラブラン酸/アモキシシリン	MEPM	メロペネム	KM	カナマイシン
SBT/ABPC	スルバクタム/アンピシリン	BIPM	ビアベネム	TOB	トブラマイシン
TAZ/PIPC	タゾバクタム/ピペラシリン	DRPM	ドリペネム	DKB	ジベカシン
セフェム		マクロライド		AMK	アミカシン
CET	セファロチン	EM	エリスロマイシン	ABK	アルベカシン
CEZ	セファゾリン	CAM	クラリスロマイシン	GM	ゲンタマイシン
CEX	セファレキシン	RXM	ロキシスロマイシン	ISP	イセパマイシン
CCL	セファクロル	AZM	アジスロマイシン	その他	
CXM	セフロキシム	リンコマイシン		PLB	ポリミキシンB
CTM	セフォチアム	LCM	リンコマイシン	VCM	バンコマイシン
CMZ	セフメタゾール	CLDM	クリンダマイシン	TEIC	テイコプラニン
CPZ	セフォペラゾン	キノロン		CP	クロラムフェニコール
CZX	セフチゾキシム	NA	ナリジクス酸	ST	SMX/TMP
CMX	セフメノキシム	LFLX	ロメフロキサシン	FOM	ホスホマイシン
CAZ	セフトアジジム	NFLX	ノルフロキサシン	MUP	ムピロシン
CTX	セフォタキシム	OFLX	オフロキサシン	RFP	リファンピシン
CTRX	セフトリアキソン	OBFX	オルビフロキサシン	LZD	リネゾリド
CFTM	セフテラム	CPFX	シプロフロキサシン	DAP	ダプトマイシン
CFDN	セフジニル	TFLX	トスフロキサシン	CL	コリスチン
CDTR	セフジトレン	LVFX	レボフロキサシン		
CPDX	セフポドキシム	ERFX	エンロフロキサシン		
CMNX	セフミノクス	GFLX	ガチフロキサシン		
SBT/CPZ	スルバクタム/セフォペラゾン	PZFX	パズフロキサシン		
CFPM	セフェピム	PUFX	プルリフロキサシン		
CZOP	セフォゾプラン	MFLX	モキシフロキサシン		
CFPN	セフカペン	GRNX	ガレノキサシン		
CFIX	セフィキシム	STFX	シタフロキサシン		
CFV	セフォベシン	PRA	プラドフロキサシン		

- ・薬剤セットはご指定がない場合、基本セットとなります。
- ・材料が皮膚表面の開放性膿の場合、皮膚セットをお勧めします。
- ・材料が尿の場合、尿セットをお勧めします。
- ・セットに薬剤を追加する場合、3薬剤まで無料です。
- ・4薬剤以上の追加は、1薬剤ごとに220円となります。